

## IMPORTANTE

- O produtor deve comprovar a vacinação contra brucelose nos meses de maio e novembro no escritório da Divisão Sanidade Animal - DSA da Secretaria de Estado de Agricultura - SEAB, mais próximo
- O atestado de vacinação é a prova que o animal já foi vacinado
- Vacinar várias fêmeas de várias propriedades no mesmo dia reduz o custo de vacinação
- Em caso de suspeita chame o médico veterinário habilitado
- Animais doentes devem ser marcados com um "P" na cara, isolados do restante do rebanho
- Sua propriedade pode ser certificada como LIVRE da brucelose e tuberculose. Informe-se na Unidade Veterinária da SEAB de seu município
- Consuma somente alimento de origem animal somente com inspeção sanitária (SIM/SIP/SIF)

### APOIO



# Brucelose Bovina

PROTEJA SEU REBANHO

VACINE AS BEZERRAS!  
DE SUA PROPRIEDADE!



## O que é Brucelose?

É uma doença muito contagiosa, que ataca bovinos, bubalinos, cabras, ovelhas, suínos e pode ser transmitida ao homem.

A brucelose não tem cura ou tratamento, e os animais doentes devem ser sacrificados.

## Contaminação do homem?



- Pode ocorrer no contato direto:
  - com animais doentes
  - com fetos abortados
  - com carcaças contaminadas no abate
- Na hora da parição
- No momento da inseminação
- Ao tomar leite cru sem inspeção sanitária
- Ao comer queijos, iogurtes, coalhadas e outros derivados de leite sem inspeção sanitária

## Sinais da brucelose nos animais e seus prejuízos:

- Aborto
- Nascimento de bezerros fracos
- Retenção de placenta
- Repetição de cio
- Orquite - inflamação dos testículos
- Diminuição da produção de leite e de bezerros

## Como os animais são contaminados:

- Pelo contato com restos de abortos, placenta, etc. de animais contaminados
- Ao lamber a cria de uma vaca doente
- Em pastagens, água, cochos, alimentos e instalações contaminados
- Ao dar leite de vacas doentes para os bezerros
- Pela inseminação artificial - sêmen contaminado ou pela monta natural - macho contaminado

Fetos abortados e restos de placenta devem ser enterrados e/ou queimados.



## Vacinação contra a Brucelose É OBRIGATÓRIA

Desde 2002

A vacinação é a melhor forma de evitar a brucelose:

- Vacinar bezerras entre 3 e 8 meses
- As bezerras vacinadas são marcadas com um V na cara, seguido do último número do ano da vacinação
- Não vacinar fêmeas acima de 8 meses nem machos de qualquer idade
- Só permitir a entrada na propriedade de animais com o exame negativo ou vacinados
- A vacinação deve ser feita sob a responsabilidade de médico veterinário habilitado
- O exame deve ser feito por médico veterinário habilitado



VAMOS MANTER O BRASIL LIVRE DESTA DOENÇA.

Participe do CSA do seu município.

